

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВАКЦИНА ОТ ВПЧ?

Вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная (типов 6, 11, 16, 18)



Вакцина не содержит живых вирусов.



Защищает от широкого спектра новообразований,
вызванных ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов:

Злокачественных

- рак шейки матки
- рак вульвы, влагалища
- рак анального канала, вызванный ВПЧ 16, 18 типами
- цервикальная внутриэпителиальная неоплазия 1/2/3 степени (CIN), аденокарциномы шейки матки (AIS)
- внутриэпителиальная неоплазия вульвы (VIN) и влагалища (VaIN) 1/2/3 степени
- предраковые, диспластические состояния, внутриэпителиальная неоплазия анального канала 1/2/3 степени, вызванные ВПЧ 6, 11, 16, 18 типами

Доброкачественных

- аногенитальные кондиломы у мужчин и женщин



Кому показано?

- Мальчикам и мужчинам с 9 до 26 лет
- Девочкам и женщинам с 9 до 45 лет

98%

Проведение полного курса
вакцинации приводит
к образованию специфических
антител к четырем типам
ВПЧ 6, 11, 16, 18
более чем у 98%
вакцинируемых

Вакцина ставится детям 12 лет, бесплатно
Первая доза – полгода – вторая доза

По вопросам вакцинации обратитесь к врачу-педиатру



Опасность вируса папилломы человека

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа вирусов, вызывающих различные болезни у мужчин и женщин — от бородавок и кондилом до злокачественных новообразований.

Основной путь передачи ВПЧ — половой путь, возможна передача контактно-бытовым путем через предметы обихода, а также от матери новорожденному.

Вакцинация против вируса папилломы человека

Более чем в 40 странах мира вакцинация против ВПЧ включена в государственные программы вакцинации.

В ХМАО вакцинация против ВПЧ проводится с 2009 года в рамках Регионального календаря профилактических прививок



НАСЧИТЫВАЕТСЯ
>100
ТИПОВ ВИРУСОВ
ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)



8 из 10 ЖЕНЩИН
ИНФИЦИРУЮТСЯ ВПЧ В МОЛОДОМ
ВОЗРАСТЕ (16-25 ЛЕТ)

ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ:

Вирусы низкого онкогенного риска (6, 11 типа и др.) — причина развития бородавок и кондилом на наружных половых органах и шейке матки

Вирусы высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, и др.) — причина развития злокачественных образований (рак шейки матки, рак анального канала, рак вульвы и влагалища, рак головы и шеи)

- Рак шейки матки является вторым по частоте встречаемости среди женщин до 45 лет.
- Более 6000 женщин в России ежегодно умирают от рака шейки матки.
- Раку шейки матки предшествуют предраковые поражения слизистой шейки матки — дисплазии, которые при отсутствии лечения могут прогрессировать в рак.

Используются следующие вакцины:

4^x валентная рекомбинантная вакцина — защищает от 6, 11, 16 и 18 типа ВПЧ; предотвращает развитие ряда злокачественных новообразований и аногенитальных кондилом

2^x валентная рекомбинантная вакцина — защищает от 16 и 18 типа ВПЧ; предотвращает развитие ряда злокачественных новообразований

В ОСНОВЕ ВАКЦИНЫ — ВИРУСОПОДОБНЫЕ ЧАСТИЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ИНФЕКЦИЮ

Схема вакцинации для детей с 9 до 13 лет — двукратно с интервалом в 6 месяцев. Вакцина вводится внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча.



**С целью предотвращения циркуляции ВПЧ
рекомендуется вакцинировать не только девочек,
но и мальчиков**



**ВАКЦИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЬШУЮ
ЗАЩИТУ ДО ЕСТЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ
С ВИРУСОМ, ТО ЕСТЬ ДО НАЧАЛА
ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ**



Чем опасен вирус папилломы человека?

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа вирусов, вызывающих различные болезни у мужчин и женщин — от бородавок и кондилом до злокачественных новообразований.

КАК ВИРУС МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ОРГАНИЗМ?

Основной путь передачи ВПЧ — половой путь, возможна передача контактно-бытовым путем через предметы обихода, а также от матери новорожденному. Средства барьерной контрацепции не обеспечивают полную защиту от ВПЧ.

К КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ИНФИЦИРОВАНИЕ ВПЧ?

В настоящее время известно более 100 типов ВПЧ. Вирусы низкого онкогенного риска (6, 11 типа и др.) являются причиной развития бородавок и кондилом на наружных половых органах и шейке матки, а вирусы высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, и др.) приводят к развитию злокачественных образований (рак шейки матки, рак анального канала, рак вульвы, рак влагалища).

КТО БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН РИСКУ ЗАРАЗИТЬСЯ ВПЧ?

К факторам риска инфицирования ВПЧ относится молодой возраст (16–25 лет), раннее начало половой жизни, большое количество половых партнеров на протяжении жизни, несоблюдение правил гигиены.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ?

Эффективных методов лечения, направленных на уничтожение ВПЧ, в настоящее время не существует.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧ?

Эффективным методом профилактики вируса папилломы человека является вакцинация.



Вакцинация против вируса папилломы человека

ГДЕ-ТО В МИРЕ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ?

Более чем в 40 странах мира вакцинация против ВПЧ включена в государственные программы вакцинации.

ДАВНО ЛИ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ?

вакцинация против ВПЧ проводится с 2009 года в рамках Регионального календаря профилактических прививок среди девочек 12–13 лет.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК ПРОТИВ ВПЧ?

- Четырехвалентная рекомбинантная вакцина — защищает от 6, 11, 16 и 18 типа ВПЧ; предотвращает развитие ряда злокачественных новообразований и аногенитальных кондилом;
- Двухвалентная рекомбинантная вакцина — защищает от 16 и 18 типа ВПЧ; предотвращает развитие ряда злокачественных новообразований.

МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВПЧ? БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ?

Нет, в основе вакцины — вирусоподобные частицы, которые не могут вызвать инфекцию.

КАКОВА СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ?

Схема вакцинации для детей с 9 до 13 лет — двукратно с интервалом в 6 месяцев.

КАКОВ МЕТОД ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ?

Вакцина вводится внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча.

ВАКЦИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИБОЛЬШУЮ ЗАЩИТУ ДО ЕСТЕСТВЕННОЙ ВСТРЕЧИ С ВИРУСОМ, ТО ЕСТЬ ДО НАЧАЛА ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ